


LES DIFFÉRENTES FORMES DE STRABISME




On parle de strabisme quand les yeux ne regardent pas dans la même direction.

Ce trouble peut apparaître dès la naissance ou se manifester plus tard, chez l'enfant comme chez l'adulte.

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

STRABISME HORIZONTAL

ESOTROPIE




L'œil dévie vers l'intérieur, en direction du nez.

L'un des deux yeux est moins utilisé.

👉 Ce type de déviation peut entraîner une baisse de vision s'il n'est pas corrigé tôt..

STRABISME VERTICAL

HYPERTROPIE




L'œil est plus haut que l'autre

Les deux yeux ne voient plus la même chose.

👉 Cela peut donner une vision double ou une mauvaise évaluation des distances.


EXOTROPIE



L'œil dévie vers l'extérieur, en direction de la tempe.

👉 La vision apparaît floue ou double, surtout quand on est fatigué.

HYPOTROPIE



L'œil est plus bas que l'autre

L'œil voit trop bas.

👉 Les mouvements des yeux deviennent plus difficiles, ce qui peut fatiguer la vue..

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE LES DÉTECTER TÔT ?

- Pour éviter une perte de vision sur l'œil dévié (amblyopie)
- Pour améliorer le confort visuel et la vision 3D
- Pour permettre une prise en charge adaptée (rééducation, lunettes, prismes, chirurgie)